


ИСХРАНА КУНИТА



- биљојед;
- моногастрична животиња;
- сепо проширење у желуцу;
- релативно дугачак цревни тракт;
- развијен цекум – микробиолошка ферментација влакана;
- копрофагија (конзумирање меког измета у јутарњим часовима).



- ▶ Физиолошке особености варења уз велику плодност, добар раст, повољну конверзију јефтине хране и одличан квалитет мяса чине ефикасним гајење кунића од домаћинства до индустријских услова;
- ▶ уз исправно примењене зоотехничке мере исхрана постаје доминантан чинилац успеха одгајивања;
- ▶ исхрана кунића у интензивној производњи заснива се на дневним оброцима који по саставу и количини могу обезбедити адекватан економски резултат;
- ▶ утврђене су норме за исхрану различитих категорија кунића у складу са постављеним циљевима производње.



❑ У пракси се често поједностављује исхрана до те мере да ограничава биолошки капацитет животиње и угрожава здравље.

ИЗБОР ХРАНИВА

Зелена хранива



- **ОСНОВНА ХРАНА ОД РАНОГ ПРОЛЕЋА ДО ПОЗНЕ ЈЕСЕНИ**

Систем зеленог конвејера



Дневне потребе, гр/дан			
Одрасли кунји		Подмладак	
зелена маса	1000 - 1500	први месец	50
купус	500	четврти и пети месец	800
отпадци повртарства	250		

Сува каба́ста храни́ва



► **ОСНОВНА ХРАНА У
ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ**

Луцеркино сено



Дневне потребе сена, г/дан			
Одрасли кунџи	Бремените женке	Женке у лактацији	Подмладак
200-350	до 250	до 350	I 15; IV-V 200

Силажа

- Користи се током зиме и раног пролећа силажа жита (кукуруз, овас и раж), лептирњача (луцерка, сточни грашак и грахорица) те комбиноване силаже житарица и легуминоза;
- добра је силажа луцерке и куваног кромпира;
- мешавина (%): запарен кромпир 30, сточна репа 20, мрква са лишћем 10 и зелена луцерка и кукуруз у воштаном зрењу 40.



Дневне потребе силаже, г/дан			
Одрасли кунјићи	Бремените женке	Женке у лактацији	Товна грла
300-400	200-300	300-400	300-600

Сочна, коренаста и кртоласта хранива

- Посебно се користе у зимском периоду: кромпир, сточна репа, шећерна репа, мрква, чичока и бундева.
- Хранива је потребно сирова изгњечити или уситнити на комаде величине 3-4 цм.
- Кромпир треба кувати (неутрализација алкалоида соланина из љуске).



Дневне потребе сочних хранива, г/дан				
Одрасли кунџи	Бремените женке	Женке у лактацији	Товна грла	Подмладак
300-400	300-350	350-450	250-350	50-150

Зрнаста хранива

- ▶ Грлима се дају гњечена или самлевена.
- ▶ Зрно лептирњача је потребно кувати или пржити (неутрализација антинутритивних фактора).
- ▶ Користе се:
 - **жита** - кукуруз, пшеница, овас, јечам, раж;
 - **легуминозе** — грашак, грахорица и соја;
 - **уљарице** — семе бундеве и сунцокрета



Дневне потребе зрнастих хранива, г/дан					
Жита		Легуминозе		Уљарице	
одрасли	подмладак	одрасли	подмладак	одрасли	подмладак
80-150	30-90	50-100	10-50	10-30	5-15

Споредни индустријски производи

- ▶ Најчешће се користе у смешама концентрата: пшеничне мекиње, уљане сачме и погаче соје, сунцокрета, бундевиног семена и кикирикија;
- ▶ погаче треба ситно измрвити.



Дневне потребе споредних индустријских производа, г/дан			
Пшеничне мекиње		Сачме и погаче	
одрасли	подмладак	одрасли	подмладак
100-150	15-20	20-60	5-30

Анимална хранива

- Користе се:
 - млеко у праху,
 - месно и месно-коштано брашно,
 - крвно и рибље брашно.



Дневне потребе анималних хранива, г/дан			
Млеко у праху		Рибље или месно брашно	
гравидне и женке у лактацији	подмладак	гравидне и женке у лактацији	подмладак
40-80	15-30	10-20	5-15

Минерална хранива

Дневне потребе минералних хранива, г/дан			
Натријум-хлорид		Коштано брашно	
Одрасли	Подмладак	Одрасли	Подмладак
1-1,5	0,5	1-2	0,5-1

Оброци за исхрану старосних и физиолошких категорија кунџа

- ▶ Мужјаци и женке у периоду мировања;
- ▶ Исхрана пред парење и у време парења;
- ▶ Исхрана бременитих женки;
- ▶ Исхрана дојних женки;
- ▶ Исхрана одбијених младунаца

Исхрана одраслих кунића у периоду мировања

- ▶ Зимски период (гр/дан) - ливадско сено 150; силажа луцерке 100; сточна репа 150; овас (зрно) 20; пшеничне мекиње 15; со 0,6; коштано брашно 1;
- ▶ Летњи период (гр/дан) – зелена луцерка 500; кувани кромпир 80; овас у зрну 20; пшеничне мекиње 15; со 0,6; коштано брашно 1;
- ▶ Концентрована смеша (%): кукуруз 25; овас 20; пшеничне мекиње 15; сојина сачма 10; брашно луцерке 27; сточна креда 1,3; дикалцијум фосфат 0,5; со 0,2; витаминско-минерални премикс 1

Исхрана у перипду припреме за парење и у периоду парења

- ▶ Зимски период (гр/дан): сено луцерке 150; мрква 250; јечам (зрно) 35; пшеничне мекиње 15; сојина сачма 15; со 0,7; коштано брашно 1.
- ▶ Летњи период (гр/дан): ливадске траве 700; јечам 10; сојина сачма 10; со 0,7; коштано брашно 1.

Исхрана бременитих женки

- ▶ Зимски период (гр/дан): сено луцерке 200; мрква 200; овас 30; кукуруз 15; брашно луцерке 20; сунцокретова сачма 20; со 1,4; коштано брашно 2.
- ▶ Летњи период (гр/дан): зелене легуминозе 800; кукуруз 30; сунцокретова сачма 20; со 1,4; коштано брашно 2.
- ▶ Концентрована смеша (%): кукуруз 19; овас 15; грашак 12; пшеничне мекиње 12; сојина сачма 12; месно брашно 2; брашно луцерке 25; сточна креда 1,3; дикалцијум фосфат 0,5; со 0,2; витаминско-минерални премикс 1.

Исхрана женки у време лактације

- Прва половина лактације:
- ▶ Зимски период (гр/дана): сено луцерке 300; силажа луцерке 350; мрква 100; овас 30; кукуруз 20; мекиње 10; сачма соје 20; рибље брашно 5; со 1,4; коштано брашно 2.
- ▶ Летњи период (гр/дана): ливадске траве 900; сточна репа 300; мрква 100; овас 30; мекиње 10; сојина сачма 20; месно брашно 5; коштано брашно 2; со 1,4.

- Друга половина лактације:
- ▶ Зимски период (гр/дана): сено луцерке 350; сточна репа 300; мрква 150; овас 40; кукуруз 30; брашно луцерке 80; сојина сачма 25; рибље брашно 10; коштано брашно 2; со 1,5.
- ▶ Летњи период (гр/дана): зелена луцерка 1000; кувани кромпир 350; мрква 100; кукуруз 40; мекиње 20; погача сунцокрета 30; месно брашно 10; коштано брашно 2; со 1,5.
- ▶ Концентрирана смеша (%): кукуруз 20; јечам 13; пшеница 10; мекиње 10; брашно луцерке 20; сојина сачма 13; сунцокретова сачма 7; рибље брашно 4; сточна креда 1,3; дикалцијум фосфат 0,5; со 0,2; витаминско-минерални премикс 1.

Исхрана одбијених младунаца

Период	Житарице	Мекиње	Уљане погаче	Кромпир	Мрква	Шећерна репа	Трава	Сено
1-2 месеца								
летњи	40	-	-	-	-	-	300	-
зимски	40		-	20	50	30	-	85
2-3 месеца								
летњи	35	-	-	-	-	-	500	-
зимски	45	10	5	50	50	60	-	100
3-4 месеца								
летњи	50	-	-	-	-	-	550	-
зимски	50	15	10	80	-	110	-	140

Тов кунїћа

- ▶ Припремни, основни и закључни период;
- ❖ Припремни период: кукуруз, овас, јечам, пшеница, стари пшенични хлеб, траве, легуминозе, мрква, репа, мекиње, уљане погаче, сточни купус и добро сено.
- ❖ Основни период: кувани кромпир у смеши са мекињама, кукуруз у зрну, грашак, овас, пшеница, јечам уљане погаче. Сочна хранива се не дају, а сено у малим количинама.
- ❖ Закључни период: повећати количину концентрованих хранива.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ