

МЕСО КУНИЋА



- ❑ Веома корисна животиња;
- ❑ висок кланични рандман;
- ❑ висока хранљива вредност меса.



Старост у време клања	IV месеца	V месеци
Жива мера	2,206 кг	2,367 кг
Рандман на живу меру		
- предњи део	20 %	20,1 %
- задњи део	34,2 %	33,0 %
Пропорција у односу на живу меру:		
- крв	2,4 %	2,9 %
- кожа	10,1 %	11,2 %
- глава	5,6 %	5,6 %
- сувратак	2,7 %	2,7 %
- срце	0,3 %	0,2 %
- јетра	2,5 %	2,6 %
- утроба	11,5 %	11,4 %
- сало	1,1 %	1,0 %

- добар квалитет меса;
- висок садржај протеина, витамина Б, фосфора и гвожђа;
- мањи садржај масти и холестерола

Старост код клања	Мужјаци	Женке	Мужјаци	Женке
	IV месеца		V месеци	
Протеин	21,73	21,77	20,65	22,11
Липиди	4,34	4,36	4,88	4,58
Пепео	1,20	1,23	1,11	1,21

Најхранљивије



Месо кунића

➤ **ВЕЋИ САДРЖАЈ
ПРОТЕИНА**

Слично по укусу и
садржају масти



Пилећа месо



Говеђе месо



Свињско месо

☐ За производњу 1 кг меса кунића не утроши се више хранива него за 1 кг овчијег, свињског или говеђег меса.

Врсте мяса	Хемијски састав (%)			
	Вода	Протеини	Маси	Минерали
Кунић	67,86	25,50	2,13	4,01
Пилетина	74,8	21,50	2,5	1,1
Јунетина, задњи део	62,2	19,3	18,3	0,9
Јунетина, предњи део	62,5	18,3	18,9	0,9
Телетина, задњи део	70,9	20,7	8,3	1,0
Телетина, предњи део	71,7	20,0	8,0	0,9
Овчетина, предњи део	52,9	15,6	30,9	0,9
Свињетина, плећка	51,2	13,3	34,2	0,8

- Месо кунџа је лако сварљиво;
- препоручује се за исхрану:
 - ✓ жена у трудноћи;
 - ✓ особама са кардиоваскуларним обољењима.

❑ Месо кунџа је здраво, и инфективне болести које се могу пренети на човека ретко се јављају код ове врсте домаћих животиња



-
- производња и квалитет мяса у кунџарству зависе од начина одгајивања подмлатка;
 - млечност женке је од великог значаја за развитак младунаца;
 - избор женки по млечности је ефикасно средство за повећање рентабилности кунџарске производње;
 - степен млечности женке се може оценити по тежини младунаца са 20-30 дана након кођења.



-
- за време лактације женка даје од 40-270 грама млека;
 - у 100 гр млека има 15-20 гр протеина и 15-27 гр масти;
 - за 1 гр прираста кунићу је потребно 1-2,5 гр млека;
 - кунић удвостручи тежину за 6 дана по рођењу;
 - исти ефекат код телади се постиже за 47 дана.

Раса	Тежина у гр. (I месец)
Белгијски оријаш	600-700
Бечки плави	450-550
Сојветски чинчила	500-600

Рентабилност производње кунића за месо

ИНДИВИДУАЛНА ГАЗДИНСТВА

- ☐ производња подмлатка;
- ☐ производња товљеника



ИНТЕНЗИВНО ГАЈЕЊЕ

- ☐ затворен систем производње



➤ ДОПУНСКИ ПРИХОД

Primer gajenja 50 ženki za priplod, u zasebnim kavezima, uz dva časa dnevnog rada jedne osobe

Smeštajni uslovi:

- potpuna zaštita od glodara i drugih štetočina (grabljivica);
- obezbeđenje toplotne izolacije;
- održavanje temperature ambijenta između 10 i 25° C, prema sezoni;
- obezbeđenje od promaje;
- izgradnja kaveza od cementa ili sa rešetkastim podom od zavarenih žica, prečnika 2 mm; upotreba potpuno rešetkastog kaveza, tj. od žičane mreže, pretpostavlja bolje kondicioniranje smeštajnog prostora, naročito dodatnog grejanja;
- postavljanje u svakom kavezu po jednog sandučića za gnezdo s dovoljnom količinom slame;
- redovno čišćenje, pranje kaveza vodom, zatim dezinfekcija (2⁰/₀-nim krezolom — antiseptičkim sredstvom) svakog drugog meseca, posle svakog odbijanja;
- temeljno čišćenje zgrade-smeštajnog prostora za kaveze (poda, zidova, plafona), a zatim dezinfekcija 2⁰/₀-nim krezolom — jedanput godišnje;
- korišćenje hranilica radi sprečavanja rasipanja hrane, kao i obezbeđenje jasala za seno;
- davanje dopunskih hraniva u vidu granulirane smeše, sena i žitarica radi izbalansiranja sa osnovnim hranivima; zatim dodavanje azotnih materija, minerala i vitamina u cilju intenzifikacije proizvodnje.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ