


Protura
"Ellipura"
Collembola
Diplura
Archaeognatha
Thysanura s. lato
Zygentoma
Insecta
Ephemeroptera
"Palaeoptera"
Odonata
Plecoptera
Isoptera
Blattodea
Mantodea
Grylloblattodea
Mantophasmatodea
Polyneoptera
Pterygota
Phasmatodea
Embiidina
Orthoptera
Dermaptera
Zoraptera
Neoptera
Psocoptera
Phthiraptera
Paraneoptera
Thysanoptera
Hemiptera
Neuroptera
Megaloptera
Raphidioptera
Coleoptera
Strepsiptera
Endopterygota
Diptera
Mecoptera
Siphonaptera
Trichoptera
Lepidoptera
Hymenoptera



ORDO THYSANOPTERA

РЕСОКРИЛЦИ, РЕСИЧАРИ, ТРИПСИ

гр.thysanos = реса и pteron = крило




- То су ситни инсекти (око 1 mm дужине или мањи), са витким, издуженим телом, јасно видљивим сегментима.
- Тело је голо или покривено ретким длачицама.
- Боја се креће од беле или жуте до смеђе или црне. Неки од предаторских врста (*Frankliniella occidentalis*) су светлије у боји, са црвенкасто-наранџастим трбухом.






Caput



antenna
ocelli
compound eye
(a)
50 µm
mandibular stylet
labrum
maxilla
maxillary stylets (laciniae)
maxillary palp
labium
labial palps

A slide-mounted thrips




Terebrantia:
Thripidae


Living thrips, at rest



Terebrantia:
Thripidae



Tubulifera:
Phlaeothripidae


antennae
ocellar setae
ocelli
antennal segment III and IV
(with forked sense cones)
postocular setae
pronotum
posteroangular seta
forewing
mesonotum
metascutum
1st vein
2nd vein
abdominal
tergite II
ctenidia
abdominal tergite VIII
spiracle
ovipositor (ventral)
posteromarginal comb



Нимфе и имага *Haplothrips tritici*



Drepanothrips reuteri








Frankliniella occidentalis
Калифорнијски цветни трипс





Thrips tabaci u Frankliniella occidentalis


UGA140










Nektarina sorta Caldezi 2000 sa simptomom nekroze pokožice nastala za vreme ishrane *F.occidentalis* u fazi cvetanja i simpomom silveringa



Nectarine sorte Ali Top i Caldesi 2000 sa simptomima silveringa i sorta Max-7 u fazi početka zrenja



Симптоми присуства трипса



Лепљива клопка

